



שתלים



***6300**
או ***מַכִּידָנֵט**
(*4535246)

Data Pro | proximity



שאלות ותשובות



האם ניתן לשלוּף את השינויים אם הן מחוברות לשתלים?

את רוב השינויים המלכואתיות המוחוברות לשתלים רק רופא השינויים יכול להרכיב ולשלוף. עם זאת, במקרה שיש מושרכות שינויים תוחבות שלמה המוחוברת לשתלים על ידי מחברים, ניתן לשלוּף אותן הוחזה ליקוי.

מה אם קורתה תאונה?

שתלים והשינויים הנסמכו עליהם עלולים להימק בתאונת כמו شيء טبعית, שכן חשוב להרכיב מגן שוניים במקורה של שימוש בספורט העலול לפגוע בפיהם. אם גרם מכך, ניתן לפרק את השינויים מהשתל ולהחליפם. עם זאת, אם ברגע התסיטוים יזוק ולא ניתן לתקן או שaska פדי להיסרו, ניתן להשאירו בבלסת ללא כל בעיה. ניתן להaddir שטל ווסף בסיכון אליו כדי להקלify את השתל שיוק.

מה קורה אם השתל נכשל (אינו נקלט בעצמו)?

הונעה זו מתרחשת לעיתים רחוקות. אם השתל נכשל במהלך תקופת ההחלמה או פיד לאחריה, כל להיסרו והחלמה מתרחשת כרגע. לאחר שהלסת החליפה, ניתן לרוב להשתיל שטל אחר במקומו.

האם טיפול יקר?

הטיפול עלול להיות יקר. באפקעות ביטוח משלימים ניתן להזיל משמעויות את עלות הטיפול. מרפאה ניתן לקבל תכניות טיפול כולל הצעת מחיר מפורטת. חשוב לציין כי, בסותה האורו, שתלים הם אפשרות עליה, חסכנות וטובה יותר ובעלות יתרונות רבים. ביביהם:

1. שטל המכלהף שנבודדת מונע את הצורך לשיפור את השינויים^K ששי הצדדים לכתמים כדי לתמוך בגשר.
2. בדרך כלל עם שינוי תוחבות רגולות קשוח יותר לאוכל או לדבר היסב. משום שהשינויים הותובות דומות. אולם תוחבות המוחוברות לשתלים אינן גורמות לביעות מפני שהן מעוגנות בלסת באמצעות מחברים.

כיצד מטפלים בשתלים לאחר התשתלה?

לאחר היותו מקבלים משבכי כאבים מהרופא. אם יש משבכי כאבים בבית, אפשר גם להשתמש בהם במקרה הצורך. בימיים שלאחר התשתלה, לשטים מקבלים אנטיביוטיקה. אין לנו, לעשות פעילות גופנית ואך לא לנוהג באותו יום. אין לשטוּף את האזרור ווש לאכל רק פוזו רר. בנוסף, חשוב לשמר על ניקוז הפה על ידי צחצחו שינויים. אך יש להפסיק מכך באופן השstral. ניתן להשתמש בכך על בסיס כלורוקסידין מדי יום במהלך השבוע הראשון לאחר התוּנה (ניתן לרכש אותם בבית הפרחת).

ומה לאחר התשתלה?

השתלים צריכים להתחבר (להתאחד) לעצם לאחר התוּנה. תהליך זה נמשך 3-6 חודשים לפחות בבלסת הרחמתה ו-6 חודשים בלסת העליונה. לעיתים שתלים אלו יכולים להיות יציבים דיים עם החדרתם, על מנת שייתן היה להרכיב עליהם את השן המלכואתית הזמנית באופן מיידי. במקרה של התשתלה שנאות או יותר, מרכיבת ביותיים תותבת זמנית, החליק או שלמה. במקרה של מושרכות שינויים תותבות מלאה, ניתן להמשיך להרכיב אותה במשך כל תהליך הריפוי לאחר שתיששה בה התאמה לאחר התוּנה.

האם קשה לנוקות את השינויים לאחר התשתלה?

לא, אולם חשוב להקפיד על הטיפול לאחר התוּנה, כדי להבטיח שטל מצליח אשר יחזק מעמד זמו רב. רופא השינויים מסביר בפריטות כיצד לטפל בשתלים. יקיי סביב השינויים המוחוברות לשתלים אינו קשה יותר מאשר שינויים טבעיים. עם זאת, ניתן שירוי אזורים שהגישה אליהם קשה ויתן לקבל הסבר על שיטות אשר יעדרו לךותם. במקרה, מומלץ לבקר אצל השינויים לעתים קרובות יותר.

במקרה של מחלת חניכיים, האם מחלת החניכיים נשארת גם עם השתלים החדשים?

כן, אם לא מטפלים בחניכיים כראוי. אם שומרים על ניקוזון וללא מושגים, הסיכוי לכישלון של השתלים לאורך זמן נמור יותר.

מהם שתלים דנטליים?

שתל דנטלי הואborg עשוי טיטניום המוחדר לתוך עצם הלסת, ומשמש כשן מאחדת לכתר, לנשר או לעזון תותבת אחת או יותר.

האם שתלים בטוחים וכמה זמן הם מחזקים מעתך?

שתלים הם מחרוז מוכחה, בדוק ומונזה. יותר מ-95% מהשתלים המודרניים נצלמים בהצלחה עצם הלסת.

יש לי כמה שינויים משלבי. האם אני עדין יכול לעשות שתלים?

כן. ניתן להחליף כל מספר שינויים בשתלים - החל משן אחד ועד למספר שינויים שלם. לאחר בדיקה פתאומית, יכול רופא השינויים ליעץ לך האם שתלים דנטליים יכולים להיות מתאימים עבורך.

האם תמיד ניתן להשתמש בשתלים כתחליף לשן חסרה?

תלי במצב העצם בלסת. רופא השינויים שלך ישרור מסטר בדיקות מיוחדות כדי לבדוק האם ממות העצם בלסת מספקה. אם אין מספיק עצם או שהעצם איזה בראיה דיה, ניתן שלא יהיה ניתן להרכיב שתלים ללא השתלה עצם במקרה אחר.

האם טיפול התשתלה שניינים כאב?

הרכבת שתלים היא למשהו יתווות קטן, ניתן לבצעו בהרדמה מקומית פשוטה וולשתים עם טשטוש אם החשש הוא גדול). במקרה מסויים, ניתן שרופא השינויים יצטרך להשתמש בהרדמה כללית. בזמן ההחליף לא חשים כל כאב, אולם תיתכן תחושת אי נוחות בשבוע שלאחר התוּנה, בעיקר בשל התפרים והחליף ההחלמה הרגיל.

כמה זמן אורך הטיפול?

רופא השינויים שלך יוכל לחתך לך הערקה כללית באשר ללוח הזמנים לפי התחלת הטיפול. בדרך כלל, השינויים הקבועות מורכבות בין 3-6 חודשים לאחר החדרת השתלים. זמו זה מתאריך בצדיה ובוצעה השתלת עצם מקידמה לצורך עיבוי עצם הלסת.

כiom ניתן לבצע שיקום על גבי השתלים כדי לאחר ביצוע ההשתלה. עם זאת, יש לבדוק עם רופא השינויים האם מחרוז זה הוא המתאים ביותר.